

『第4版 Evidence based medicine を活かす 膠原病・リウマチ診療』
正誤表

『第4版 Evidence based medicine を活かす 膠原病・リウマチ診療』（2020年5月14日第4版第1刷～2021年6月10日第4版第3刷）におきまして、誤りがございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正申し上げます。







(2021年12月2日 メジカルビュー社編集部)

頁	該当箇所	誤	正
440	本文 16 行目	・・・高用量のステロイド投与(PSL0.75～1.0 μ g/kg/日)が基本である。	・・・高用量のステロイド投与(PSL0.75～1.0mg/kg/日)が基本である。
549	図 4 説明文 2 行目	・・・耳下腺への集積は範囲で刺激後の排泄は良好である。	・・・耳下腺への集積は正常範囲で刺激後の排泄は良好である。

『第4版 Evidence based medicine を活かす 膠原病・リウマチ診療』
正誤表

『第4版 Evidence based medicine を活かす 膠原病・リウマチ診療』（2020年5月14日第4版第1刷～2021年6月10日第4版第3刷）におきまして、誤りがございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正申し上げます。

(2021年7月5日 メジカルビュー社編集部)

頁	該当箇所	誤	正
123	図 23 凡例	 プラセボ  ペフィシチニブ100mg  ペフィシチニブ 150mg	 プラセボ  ペフィシチニブ100mg  ペフィシチニブ 150mg

『第4版 Evidence based medicine を活かす 膠原病・リウマチ診療』
正誤表

『第4版 Evidence based medicine を活かす 膠原病・リウマチ診療』（2020年5月14日第4版第1刷）におきまして、誤りがございました。ここに深くお詫び申し上げますとともに、訂正申し上げます。

(2020年5月14日 メジカルビュー社編集部)

頁	該当箇所	誤	正
110	図13 タイトル	…2年後の DAS28 寛解率	…24 週後の DAS28 寛解率
	図13 説明文	…2年間にわたり比較した。トシリズマブに切り替えたスイッチ群では、では、トシリズマブ+MTX と同等の効果を認めた。	…2年間にわたり比較した。図は24 週後の結果である。トシリズマブに切り替えたスイッチ群では、(削除)トシリズマブ+MTX と同等の効果を認めた。