



『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』正誤表

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』第1版第1刷（2023年3月30日）に誤りがありました。

ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。



（2023年5月19日メジカルビュー社編集部）

ページ	該当箇所	誤	正
p.48	処方箋（変更前・変更後）	フェブキシスタット（フェブリク®）錠	フェブキシスタット（フェブリク®）錠 20mg
p.105	表1中 代表的な商品名 （リナグリプチンの欄）	トラディアンス®配合錠 BP（エンパグリフロジン 25 mg）	トラディアンス® 配合錠 BP（エンパグリフロジン 25 mg/ リナグリ プチン5mg ）
p.160	図1b気管支喘息	軌 道過敏性亢進	気 道過敏性亢進
p.203	図1タイトル	トラマドール塩酸塩 ・活性代謝物M1の作用	トラマドール ・活性代謝物M1の作用
p.217	本文上から6行目	一方、粘液 修復 薬の…	一方、粘液 潤滑 薬の…
p.218	本文下から2行目	ムコダイン® 錠	ムコダイン®
p.231	処方箋（Case1・Case2）	ポノプラザン（タケキャブ®）錠 20 m G レバミピド（ムコスタ®）錠 100 m G	ポノプラザン（タケキャブ®）錠 20 mg レバミピド（ムコスタ®）錠 100 mg
p.331	本文下から2行目	…症の違いから、 レストレックス 症候群…	…症の違いから、 レストレスレッグス 症候群…
p.335	図1内の見出し	速放製剤・徐放製剤（ロピニ カ ール;定常状態での内服時） 貼付製剤（ロチゴ ジ ン貼付時）	速放製剤・徐放製剤（ロピニ ロ ール;定常状態での内服時） 貼付製剤（ロチゴ チ ン貼付時）
p.341	Answer	・スマトリプタンは血管収縮作用があり、脳血管障害や心疾患のある患者には禁忌です。 ・ スマトリプタンはラスミジタンよりも安価であるため 、心血管疾患およびコントロール不良の高血圧を合併する片頭痛患者への使用が推奨されます。	・スマトリプタンは ラスミジタンよりも安価ですが 、血管収縮作用があり、脳血管障害や心疾患のある患者には禁忌です。 ・ ラスミジタンはスマトリプタンよりも血管への影響が少なく 、心血管疾患およびコントロール不良の高血圧を合併する片頭痛患者への使用が推奨されます。
p.349	本文上から4行目	…断薬はタムスロシン、シ ド ロシン、…	…断薬はタムスロシン、シ ロ ドシン、…
p.383	図2		 <p>「精製ヒアルロン酸Na点眼」と「ジクアホソル Na点眼」を入れ替え（□）</p>

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』正誤表

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』（2023年3月30日 第1版第1刷）に誤りがありました。
ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2023年4月4日メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
p.vi	高血圧治療薬①のタイトル	エナラブ ソ ルとテルミサルタン…	エナラブ ソ リ ルとテルミサルタン…
p.vi	利尿薬②の頁数	8	48
p.x	抗菌薬③の頁数	83	283
p.4	表1タイトル	エナラブリルと バル サルタンの比較	エナラブリルと バル テルミ サルタンの比較
p.11	表1タイトル	ロサルタンと テルミ サルタンの比較	ロサルタンと テルミ バル サルタンの比較
p.196	図1 エスフルルピプロフェン・ハッカ油内の見出し	2規格（サイズ）	1規格（サイズ）
p.198	文献	3) 大正製薬，帝人ファーマ：ロコアテープを適正にご使用いただくために（2019年4月改訂） https://medical.taisho.co.jp/di/infoproper/infoproper_loqoa.pdf （2023年2月20日閲覧） 4) 久光製薬：光接触皮膚炎発現後の注意-光接触皮膚炎を悪化させないために-（2022年7月改版） https://www.hisamitsu.co.jp/medical/data/hisamitsu-anzentokusyuu.pdf （2023年2月20日閲覧）	3) 久光製薬：光接触皮膚炎発現後の注意-光接触皮膚炎を悪化させないために-（2022年7月改版） https://www.hisamitsu.co.jp/medical/data/hisamitsu-anzentokusyuu.pdf （2023年2月20日閲覧） 4) 大正製薬，帝人ファーマ：ロコアテープを適正にご使用いただくために（2019年4月改訂） https://medical.taisho.co.jp/di/infoproper/infoproper_loqoa.pdf （2023年2月20日閲覧） 文献3) と4) を入れ替え
p.203	図1		 「脳へ」(□)の文言を追加
p.203,204	文献番号	2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) (元の文献1) 渡邊裕司：なぜ効く？どう違う？を理解し処方するための治療薬の臨床薬理データブック，日本医事新報社，2018. を削除)
p.208	表1一般名	トラマドール塩酸塩 オキシコドン塩酸塩水和物	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン ヒドロモルフォン塩酸塩 オキシコドン塩酸塩水和物 ヒドロモルフォン塩酸塩
p.209	Case2 Rp.2	…1時間以上空けて内服 10日分	…1時間以上空けて内服 10回分
p.214	上から8行目	…使用することとなっている ¹⁾ 。…	…使用することとなっている ³⁾ 。…