

## 『最新化学療法レジメンー消化器癌ー』正誤表

『最新化学療法レジメンー消化器癌ー』（第1版第1刷、第1版第2刷）に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2006年6月27日 メジカルビュー社編集部)

正

誤

CDDP 70mg/m<sup>2</sup>



CDDP 700mg/m<sup>2</sup>

### 治療成績

切除不能進行または再発食道扁平上皮癌に対して、3週間毎にCDDP 700mg/m<sup>2</sup> day1、5-FU 700mg/m<sup>2</sup> day1～5投与を行った結果をIizukaらが報告し、奏効率は35.9% (14/39)で奏効例での生存期間中央値は9.2月で非奏効例では5.6月と報告した。5-FU+CDDP併用療法は食道癌においては最も頻用されているレジメである。

# 『最新化学療法レジメンー消化器癌ー』 正誤表

『最新化学療法レジメンー消化器癌ー』（第1版第1刷）に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2006年4月12日 メジカルビュー社編集部)

正

CPT-11(カンプト)  
100mg/m<sup>2</sup>

誤

CPT-11(カンプト)  
10mg/m<sup>2</sup>

5-FU 500mg/m<sup>2</sup>

ロイコポリン(I-LV)  
10mg/m<sup>2</sup>

投与スケジュール

Day 1 ..... 8

CPT-11, FU, I-LV 2週投与、1週休薬

q:3wks