



定価（本体 2,800 円＋税）

B 6 変型判 160 ページ
2015 年 12 月 25 日 刊行
ISBN978-4-7583-0392-7
メジカルビュー社

流速表

● オキファスト[®]4倍希釈液 (2.5mg/mL)組成：オキファスト[®] (50mg・5mL) 2A + 生食30mL (全量 40mL)
or オキファスト[®] (50mg・5mL) 1A + 生食15mL (全量 20mL)

オキファスト [®] 4倍希釈液	オキシコンチン [®]
0.1mL/時 (6mg/日)	8mg
0.2mL/時 (12mg/日)	16mg
0.3mL/時 (18mg/日)	24mg
0.4mL/時 (24mg/日)	32mg
0.5mL/時 (30mg/日)	40mg
0.6mL/時 (36mg/日)	48mg
0.7mL/時 (42mg/日)	56mg
0.8mL/時 (48mg/日)	64mg
0.9mL/時 (54mg/日)	72mg
1.0mL/時 (60mg/日)	80mg

● オキファスト[®]原液 (10mg/mL)組成：オキファスト[®] (50mg・5mL) 10A (全量 50mL)
or オキファスト[®] (50mg・5mL) 20A (全量 100mL)

オキファスト [®] 原液	オキシコンチン [®]
0.1mL/時 (24mg/日)	32mg
0.2mL/時 (48mg/日)	64mg
0.3mL/時 (72mg/日)	96mg
0.4mL/時 (96mg/日)	128mg
0.5mL/時 (120mg/日)	160mg
0.6mL/時 (144mg/日)	192mg
0.7mL/時 (168mg/日)	224mg
0.8mL/時 (192mg/日)	256mg
0.9mL/時 (216mg/日)	288mg
1.0mL/時 (240mg/日)	320mg

● フェンタニル原液 (50μg/mL)

組成：フェンタニル (250μg/5mL) 10A (全量 50mL)
or フェンタニル (250μg/5mL) 4A (全量 20mL)

フェンタニル原液	経口モルヒネ	フェントス [®]
0.1mL/時 (0.12mg/日)	12mg	
0.2mL/時 (0.24mg/日)	24mg	
0.3mL/時 (0.36mg/日)	36mg	
0.4mL/時 (0.48mg/日)	48mg	
0.5mL/時 (0.60mg/日)	60mg	2mg

(続く)

(続き)

フェンタニル原液	経口モルヒネ	フェントス [®]
0.6mL/時(0.72mg/日)	72mg	
0.7mL/時(0.84mg/日)	84mg	
0.8mL/時(0.96mg/日)	96mg	
0.9mL/時(1.08mg/日)	108mg	
1.0mL/時(1.20mg/日)	120mg	4mg

● 1%モルヒネ塩酸塩注4倍希釈液 (2.5mg/mL)

組成：1%モルヒネ塩酸塩注(50mg・5mL) 2A + 生食30mL (全量 40mL)
or 1%モルヒネ塩酸塩注(50mg・5mL) 1A + 生食15mL (全量 20mL)

1%モルヒネ塩酸塩注4倍希釈液	経口モルヒネ
0.1mL/時 (6mg/日)	12mg
0.2mL/時(12mg/日)	24mg
0.3mL/時(18mg/日)	36mg
0.4mL/時(24mg/日)	48mg
0.5mL/時(30mg/日)	60mg
0.6mL/時(36mg/日)	72mg
0.7mL/時(42mg/日)	84mg
0.8mL/時(48mg/日)	96mg
0.9mL/時(54mg/日)	108mg
1.0mL/時(60mg/日)	120mg

● 1%モルヒネ塩酸塩注原液 (10mg/mL)

組成：1%モルヒネ塩酸塩注(50mg/5mL) 10A (全量 50mL)
or 1%モルヒネ塩酸塩注(50mg/5mL) 4A (全量 20mL)

1%モルヒネ塩酸塩注原液	経口モルヒネ
0.1mL/時 (24mg/日)	48mg
0.2mL/時 (48mg/日)	96mg
0.3mL/時 (72mg/日)	144mg
0.4mL/時 (96mg/日)	192mg
0.5mL/時(120mg/日)	240mg
0.6mL/時(144mg/日)	288mg
0.7mL/時(168mg/日)	336mg
0.8mL/時(192mg/日)	384mg
0.9mL/時(216mg/日)	432mg
1.0mL/時(240mg/日)	480mg